



DET NYFØDTE FØL

Når føllet først er ude går det stærkt - her er fem parametre, som skal opfyldes:

- Inden for de første 1-2 timer skal føllet komme op at stå.
- Inden for 2 timer skal føllet die hos hoppen.
- Indenfor 3 timer skal efterbyrden skal være afgang.
- Inden for 10 timer skal føllet urinere første gang.
- Inden for 24 timer skal føllet have haft sin første afføring, som er sort og oftest hård (meconium).

størstedelen af de problemer, der kan opstå i forbindelse med det nyfødte føl, kan føres tilbage til manglende indtag af tilstrækkelige mængder råmælk – vær derfor ekstra opmærksom på føllet, hvis:

- Føllet ikke har fået råmælk indenfor de første 8 timer.
- Hoppen har haft mælkeløb inden folingen.
- Der er mælkemangel pga. manglende yverudvikling hos hoppen.
- Hoppen står med et spændt yver.
- Hoppen er kilden, og afviser derfor føllet.
- Felingen var kompliceret eller langvarig.
- Hoppen får tilbageholdt efterbyrd eller anden sygdom.
- Føllet er svagt eller for tidligt født.
- Føllet har problemer med at rejse sig.

Hvis ovenstående ikke opfyldes tilfredsstillende skal dyrlægen kontaktes – og husk, det er altid en god ide, at få gennemgået både hoppe og føl inden for det første døgn efter foling.





FOLING – FØR, UNDER OG EFTER

Før foling

- Lad hoppen vaccineres mod influenza og stivkrampe en måned inden forventet foling.
- Hoppen bør stå i folingsmiljøet mindst én måned før forventet foling.
- I ugerne op til folingen fjernes kun klatter, så en madras dannes.
- Vaccination mod virusabort er en god idé i 5., 7. og 9. drægtigheds måned.

Folingen

- Opblokningsperioden er oftest 1-6 timer.
- Når de cirka 15 liter fostervand går, er folingen i gang.
- I løbet af få minutter kommer forbenene til syne.
- Føllet skal være ude på maks. 20-30 minutter.
- Lad føllet ligge bagved hoppen, så det fortsat kan få blod via navlestrengen, inden en af dem rejser sig.

Efter folingen

- Inden for den første time skal føllet komme op at stå.
- Inden for 2 timer skal føllet die hos hoppen.
- Indenfor 3 timer skal efterbyrden skal være afgået.
- Inden for 10 timer skal føllet urinere første gang.
- Inden for 24 timer skal føllet have haft sin første afføring, som er sort og oftest hård (meconium).

Du skal kontakte dyrlægen hvis:

- Hoppen får mælkeløb før foling
- Opblokningsperioden er længere end 1-2 døgn
- Opblokningsveerne varer mere end 30-45 minutter uden afgang af fostervand
- Der ikke kommer fosterdele til syne indenfor 10-15 minutter efter afgang af fostervand
- Der kun kommer ét ben til syne i fødselsvejen (benene er dog normalt let forskudte)
- Hovedet/mulen ikke kommer til syne, før forknæene har passeret skedeåbningen
- Hovedet vender opad
- Veerne ophører efter afgået fostervand
- Efterbyrden ikke er afgået indenfor 3 timer
- Hoppen får kolik efter foling
- Hoppen ikke vil lade føllet drikke

